

Vomissements lors de la prise d'un traitement oral

Patients traités en hématologie-oncologie pédiatrique

TRAITEMENT ASSOCIÉ

SPÉCIALITÉS		RECOMMANDATIONS
ANTIÉMÉTIQUES	KYTRIL® , ZOPHREN® (hors forme lyoc)	<ul style="list-style-type: none"> Vomissement dans les 30 minutes après la prise : reprise de la dose habituelle Vomissement au-delà de 30 minutes après la prise : ne pas reprendre le médicament, attendre la prise suivante et ne jamais la doubler
	EMEND®	<ul style="list-style-type: none"> Vomissement dans les 30 minutes après le prise : reprise de la dose habituelle Vomissement au-delà de 30 minutes après la prise : ne pas reprendre le médicament, attendre la prise suivante et ne jamais la doubler
	PLITICAN®	<ul style="list-style-type: none"> Ne pas reprendre le médicament Attendre la prise suivante et ne jamais la doubler
ANXIOLYTIQUES	ATARAX®	<ul style="list-style-type: none"> Vomissement dans les 30 minutes après la prise : reprise de la dose habituelle Vomissement au-delà de 30 minutes après la prise : ne pas reprendre le médicament, attendre la prise suivante et ne jamais la doubler
ANTALGIQUES		<ul style="list-style-type: none"> Pour les formes à libération prolongée : ne pas reprendre et réévaluer 3 heures après. Pour les formes à libération immédiate : réévaluer 1h après le vomissement. Si persistance de la douleur, reprise d'une dose possible
ANTIBIOTIQUES	En prophylaxie BACTRIM®	<ul style="list-style-type: none"> Reprise 12h après, sauf la veille de la prise du Méthotrexate®
	En curatif	CONTACTER LE MÉDECIN

Les auteurs déclarent n'avoir aucun conflit d'intérêt avec des établissements produisant ou exploitant des produits de santé ou des organismes intervenant sur ces produits.