

# HYDROCORTISONE pour intrathécale

Hydrocortisone®

Patients traités en hématologie-oncologie pédiatrique

## PRÉSENTATION DU PRODUIT (avant préparation)

- **FLACON** : lyophilisat blanc de 100 mg
- **SOLVANT** : 2 ml d'EPPI

## MODALITÉS DE PRÉPARATION ET DE CONSERVATION

- **MATÉRIEL** : seringue en fonction du volume du produit
- **SOLVANT** : EPPI
- **PRÉPARATION STÉRILE** par IDE au lit du malade
- **STABILITÉ** : utilisation extemporanée

## VOIE D'ADMINISTRATION **INTRATHÉCALE**

### DOSE MAXIMALE PAR INJECTION : 15 MG

## EXAMENS NÉCESSAIRES AVANT L'ADMINISTRATION

- **NFS PLAQUETTES** : PL à discuter si plaquettes < 100 000/mm<sup>3</sup>  
PL après transfusion CPA si plaquettes < 50 000 / mm<sup>3</sup>

## SOINS DE SUPPORT

- EMLA
- Prémédication selon l'enfant

**! TRACER L'INFORMATION (DOSSIER PATIENT, CLASSEUR RIFHOP, COMPTE-RENDU...)**

## MODALITÉS D'ADMINISTRATION

- Durée : IT directe
- À l'abri de la lumière : non (préparation extemporanée)
- Rinçage : non

## ÉLÉMENTS ET DURÉE DE SURVEILLANCE

- **POSITION DE TRENDELENBURG** conseillée pendant au moins 1 heure pour favoriser la diffusion du produit à l'ensemble du SNC
- **ALIMENTATION AUTORISÉE 1H APRÈS LA PL** en l'absence d'effets secondaires