

Cytarabine pour intrathécale

Aracytine® et Génériques

Patients traités en hématologie-oncologie pédiatrique

PRÉSENTATION DU PRODUIT (avant préparation)

DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE (DCI)	PRÉSENTATION DU PRODUIT	CONSERVATION
CYTARABINE (Aracytine® & génériques)	Flacon de poudre (100mg avec ampoule de solvant 5 ml)	Température ambiante

- **SOLVANT** : ne jamais utiliser le solvant fourni avec le flacon pour l'administration intrathécale; à reconstituer avec du sérum physiologique

MODALITÉS DE PRÉPARATION (par la pharmacie centralisée) ET DE CONSERVATION

	CYTARABINE IT
CONSERVATION	+4°C Température Ambiante possible

DURÉE DE STABILITÉ : utilisation dans la journée recommandée

VOIE D'ADMINISTRATION **INTRATHÉCALE**

DOSE MAXIMALE PAR INJECTION : 30 mg

CONTRE-INDICATIONS

Encéphalopathies toxiques et dégénératives majorées par l'association à une irradiation crânienne

MODALITÉS D'ADMINISTRATION

VOIR **FICHE CHIM 14 INTRATHECALES GENERALITES**