

ECHELLE DAN : Echelle d'évaluation de la douleur aiguë du nouveau-né

élaborée pour mesurer la douleur d'un geste invasif chez le nouveau-né à terme ou prématuré utilisable jusqu'à 3 mois score de 0 à 10

JOUR, HEURE			
	Avant le soin	Pendant le soin	Après le soin
REponses FACIALES			
<p>0 : calme</p> <p>1 : Pleurniche avec alternance de fermeture et ouverture douce des yeux</p> <p>Déterminer l'intensité d'un ou plusieurs des signes suivants : contraction des paupières, froncement des sourcils ou accentuation des sillons naso-labiaux :</p> <p>2 : - légers, intermittents avec retour au calme</p> <p>3 : - modérés</p> <p>4 : - très marqués, permanents</p>			
MOUVEMENTS DES MEMBRES			
<p>0 : calmes ou mouvements doux</p> <p>Déterminer l'intensité d'un ou plusieurs des signes suivants : pédalage, écartement des orteils, membres inférieurs raidés et surélevés, agitation des bras, réaction de retrait :</p> <p>1 : - légers, intermittents avec retour au calme</p> <p>2 : -modérés</p> <p>3 : - très marqués, permanents</p>			
EXPRESSION VOCALE DE LA DOULEUR			
<p>0 : absence de plainte</p> <p>1 : gémit brièvement. Pour l'enfant intubé : semble inquiet</p> <p>2 : cris intermittents. Pour l'enfant intubé : mimique de cris intermittents</p> <p>3 : cris de longue durée, hurlement constant. Pour l'enfant intubé : mimique de cris constants</p>			

CARBAJAL R., PAUPE A., HOENN E., LENCLEN R., OLIVIER MARTIN M. DAN : une échelle comportementale d'évaluation de la douleur aiguë du nouveau-né. *Arch Pediatr* 1997, 4 : 623-628.