

Etoposide

**ETOPOSIDE (Etoposide® et Génériques®)
ETOPOSIDE PHOSPHATE inj (Etopophos®)**

Patients traités en hématologie-oncologie pédiatrique

PRÉSENTATION DU PRODUIT (avant préparation)

SPÉCIALITÉS	PRÉSENTATION DU PRODUIT	CONSERVATION
ETOPOSIDE® (Génériques®)	Solution prête à l'emploi à 20 mg/ml : Flacons de 5, 10, 25 et 50 ml.	À température ambiante
ETOPOSIDE® PHOSPHATE (ETOPOPHOS®)	Lyophilisat pour usage parentéral de 113,6 mg d'étoposide phosphate soit 100 mg d'étoposide.	Entre +2°C et +8°C à l'abri de la lumière

MODALITÉS DE CONSERVATION ET DE LA PRÉPARATION

	ETOPOSIDE®	ETOPOPHOS®
CONSERVATION après dilution	Température ambiante concentration maximale de la solution diluée (0,4 mg/ml)	Température ambiante

VOIE(S) D'ADMINISTRATION

ETOPOSIDE® : IVL de 1 à 2 heures (respect de 60 minutes minimum)**ETOPOPHOS®** : IVD de 5 min ou perfusion jusqu'à 4 heures

En cas d'association au cisplatine, injecter celui-ci avant l'étoposide

**PRÉVOIR UN PROTOCOLE DE TRAITEMENT EN CAS DE RÉACTION
ANAPHYLACTOÏDE (SI ADMINISTRATION IV)**

2- RINCAGE

Le rinçage doit être réalisé avec le même solvant que celui utilisé pour la préparation de la chimiothérapie (mentionné sur l'étiquette de la préparation).

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES MAJEURES

Forme injectable : risque d'augmentation de la réaction hypoglycémique en association avec insulines et sulfamides hypoglycémifiants

Etoposide

**ETOPOSIDE (Etoposide® et Génériques®)
ETOPOSIDE PHOSPHATE inj (Etopophos®)**

Patients traités en hématologie-oncologie pédiatrique

CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité au médicament (discuter la réintroduction en changeant de molécule :
étoposide↔étopophos)
Insuffisance rénale pour l'ETOPOPHOS

EXAMENS NÉCESSAIRES AVANT L'ADMINISTRATION

- **ÉLÉMENTS CLINIQUES** : trouble du rythme cardiaque pour l'étoposide (Holter si manifestation)
- **EXAMENS COMPLÉMENTAIRES** : NFS, clairance de la créatinine, bilan hépatique, ionogramme

EFFETS INDÉSIRABLES

- Nausées, vomissements,
- Diarrhée, mucite
- Neuropathie périphérique (peu fréquent)

SOINS DE SUPPORT

- Antiémétiques : potentiel émétisant modéré (10 à 30%)
- Hygiène buccale et soin de bouche

ÉLÉMENTS ET DURÉE DE SURVEILLANCE

SURVEILLANCE PARTICULIÈRE EN HDJ POUR ETOPOSIDE®, ETOPOPHOS®

- Vasodilatation périphérique (rougeur de la face)
- Hypotension si perfusion trop rapide
- Réaction anaphylactoïde

EXTRAVASATION

Produit irritant (cf.fiche n°1)