

METHYLPREDNISOLONE pour intrathécale

Depomedrol®

Patients traités en hématologie-oncologie pédiatrique

PRÉSENTATION DU PRODUIT (avant préparation)

- **FLACON** : solution injectable prête à l'emploi, 40mgr/ml

MODALITÉS DE PRÉPARATION ET DE CONSERVATION

- **MATÉRIEL** : seringue
- **CONSERVATION** : température ambiante à l'abri de la lumière
- **PRÉPARATION** : stérile par IDE au lit du malade
- **STABILITÉ** : utilisation extemporanée

VOIE D'ADMINISTRATION **INTRATHÉCALE**

DOSE MAXIMALE PAR INJECTION : 20 MG

EXAMENS NÉCESSAIRES AVANT L'ADMINISTRATION

- **NFS PLAQUETTES** : PL à discuter si plaquettes < 100 000/mm³
PL après transfusion CPA si plaquettes < 50 000 / mm³

SOINS DE SUPPORT

- EMLA
- Prémédication selon l'enfant

! TRACER L'INFORMATION (DOSSIER PATIENT, CLASSEUR RIFHOP, COMPTE-RENDU...)

MODALITÉS D'ADMINISTRATION

- Durée : IT directe
- À l'abri de la lumière : non (préparation extemporanée)
- Rinçage : non

ÉLÉMENTS ET DURÉE DE SURVEILLANCE

- **POSITION DE TRENDELENBURG** conseillée pendant au moins 1 heure pour favoriser la diffusion du produit à l'ensemble du SNC
- **ALIMENTATION AUTORISÉE 1H APRÈS LA PL** en l'absence d'effets secondaires